



Vitanica®MC

11-1-5+mikro

Flytande NPK gödselmedel med
algextrakt (kelp) för gräsytor.
Lämplig även för träd och buskar.

Vitanica MC

Produktinformation:

Flytande organiskt mineral NPK-gödselmedel baserat på tångextrakt. Används till bladgödsling av grönytor under hela växstsäsongen. Även lämplig för gödsling av träd och buskage i t ex kommunala grönområden.

Vitanica MC innehåller förutom mineralnäringsämnen värdefulla växthormoner, vitaminer och aminosyror.

Dessa är utvunna ur algen *Ecklonia Maxima* med en mycket noggrann och patenterad kallpressningsmetod. Vitanica MC stimulerar växternas tillväxt och vitalitet med sitt välbalanserade innehåll av kemiska och biologiskt aktiva ämnen.

Effekt:

Produktens innehåll av fytohormoner stimulerar rotttillväxten och utvecklingen av dem i marken. Aminosyrorna och vitaminerna förbättrar den fotosyntetiska förmågan och gräsets motståndskraft mot sjukdomar och stress.

Därmed säkerställs en frisk och sund grönyta.

Information till användaren:

Noggranna tester har visat att produkten är lämplig för rekommenderade ändamål när de används enligt våra instruktioner. Prova först i liten skala innan produkten används i dina odlingsrutiner.

Användaren är själv ansvarig för att lagerhållning och att användning sker enligt instruktionerna.

Förvaring:

I öppnad förpackning förvaras Vitanica vid +5 - +40 °C och skyddat från direkt solljus. Undvik om möjligt variationer i temperatur. Förvaras oåtkomligt för barn och djur. Undvik att andas in ångor vid användning. Öppnad säck återförsluts ordentligt och förvaras torrt.

Macronäring		Micronäring	
11 %	Kväve (N) Likv. med 61 g N/l 9% NH ₂ kväve 2% NO ₃ kväve	0,05%	Koppar (Cu) Likv. med 0,024 g Cu/l
3 %	Fosfor (P ₂ O ₅)	0,1 %	Järn (Fe) Likv. med 0,246 g Fe/l
7 %	Kaliumoxid (K ₂ O) 7% K likv. med 123 g K ₂ O/l	0,5 %	Mangan (Mn) Likv. med 0,123 g Mn/l
Samtliga näringsämnen är vattenlösliga.		Samtliga metalliska mikronäringsämnen är komplexbundna med EDTA.	
Produkten innehåller algextrakt.		I	

Växtsaft från *Ecklonia Maxima*

Fytohormoner (växthormoner)	Aminosyror	Vitaminer
Naturliga Auxiner Indol-3-ättiksyra och derivat Naturliga Cytokininer Gibberelin, spår	Glycin, Alanin, Valin Leucin, Isoleucin, Serin, Treonin, Tyrosin, Lysin Asparaginsyra, Prolin Osv.	Vitamin A Vitamin B, flera Vitamin C Vitamin E
Mineralinnehåll: Kväve, Kalium, Koppar, Järn, Mangan. Metallerna är komplexbundna med EDTA.		



Vitanica®MC

11-1-5+mikro

Blandbarhet:

Vitanica MC är möjlig att blanda med nästan alla vanliga växtskyddsmedel. Vi rekommenderar att provblanda i små kärl, för att kontrollera att det inte bildas fällning eller oönskad reaktion.

Användning:

Vitanica MC sprutas eller vattnas ut. Kan användas under hela växtperioden så länge temperaturen ligger över 0° C. Appliceringen är mest effektiv innan olika stressituationer som hård klippning, hög värme, frost eller i riskperioder för sjukdomsattacker.

Färg:

Ljusgrön

Densitet bulk:

ca 1230 g/l

PH värde:

Ca 5

Rekommendationer vid användning:

För sportplaner och fairways, spruta med 400-800 l vatten/ha.

Period	Mängd	Koncentration	Kommentarer
Vår/ sommar	10-30 l/ha	1-3,0%	400-800 liter vatten/ha rekommenderas. Ingen bevattning är nödvändig efter applicering.
Höst/sen höst, sept-dec	10-20 l/ha	1-2,0%	400-800 liter vatten/ha rekommenderas. Ingen bevattning är nödvändig efter applicering. Endast under frostfria väderförhållanden.
Efterföljande behandlingar:			
Vår/vinter	5-10 l/ha	0,5-1,5%	Ungefär 4 veckor efter första applicering, även i kombination med växtskyddsåtgärder eller vätmedel.

För greener och tees, spruta med 600-1000 l vatten/ha

Period	Mängd	Koncentration	Kommentarer
Första behandling			
Vår, feb-maj	10-20 l/ha	1-3,0%	Möjligt även med 400-600 liter vatten/ha.
Sommar, maj-aug	10-20 l/ha	1-2,0%	600-1000 liter vatten/ha rekommenderas. Ingen bevattning är nödvändig efter applicering.
Höst/ sen höst, sept-dec	8-10 l/ha	1-2,5%	Möjligt även med 400-600 l vatten/ha. Endast under frostfria förhållanden.
Efterföljande behandlingar			
Vår/vinter	2-5 l/ha	0,5-1,5%	Ungefär 4 veckor efter första applicering, varje till varannan månad. Även i kombination med växtskyddsåtgärder.
Tillsammans med växtskydd	5-10 l/ha	0,5-1,5%	Tillsätt Vitanica MC i tankblandning.
Kombinerat med vätmedel för att förebygga torrfläckar	5-15 l/ha	0,5-2,0%	Tidigt under torra vår- och försommarförhållanden använd 800-1000 l vatten/ha.

För träd och buskage.

Period	Mängd	Koncentration	Kommentarer
Vår/ sommar	2-3 l / 100 l vatten	2,0-3,0%	Bevattning eller vattning av jord i rotzonen.

Art.nr.

807 503

Benämning

Vitanica MC

Fpn

10 lit

Fpn/ pall

40 st